

*Brun LVC, Agonnoude MT, Balle MC, Séidou F, Akpo W, Flenon A, Sakpata D, Adoukonou T, Akélé Akpo MT

* luc.brun2013@gmail.com UFR Anatomie pathologique Faculté de Médecine Université de Parakou, Bénin

Introduction

L'objectif de ce travail était de déterminer la prévalence et les facteurs associés à la non pratique du dépistage du cancer du sein chez les femmes vivant à Parakou au Bénin en 2021

Matériel et méthode

Il s'agissait d'une étude transversale descriptive à visée analytique ayant inclus 375 femmes vivant à Parakou, sélectionnées par un sondage aléatoire en grappes. Les données ont été collectées du 15 juillet 2021 au 15 Aout 2021 à l'aide d'un questionnaire. Les rapports de prévalence assortis de leur intervalle de confiance ont été utilisés pour rechercher les associations avec une différence considérée significative pour une valeur de p inférieure à 0,05

Résultat

L'âge moyen des femmes était de 28 ans \pm 9,36 ans avec des extrêmes de 18 ans et 70 ans. La plupart des femmes avaient entendu parlé du cancer du sein (82,4%). La prévalence de la non pratique du dépistage du cancer du sein estimée était de 54,4% (95% IC: [0,49-0,59]). Au nombre des facteurs significativement associés à la non pratique du dépistage du cancer du sein on distinguait l'âge (inférieur à 40ans), le bas niveau d'instruction, la profession (ménagère), la situation matrimoniale (célibataires), le revenu mensuel bas de la femme, le fait de ne pas avoir d'antécédent de maladie du sein, le fait de ne pas avoir entendu parlé du cancer du sein etc...

Conclusion

La prévalence de la non pratique du dépistage du cancer du sein chez les femmes était de 54,4% (95% IC : [49,0%-59,0%]). En raison des facteurs associés à la non pratique du dépistage du cancer du sein, il importe de favoriser et accroître la participation des femmes au dépistage du cancer du sein. en améliorant leur niveau d'instruction et leur pouvoir d'achat et en mettant sur pieds de meilleures politiques de sensibilisation et de dépistage

References

- 1-Sancho-Garnier H, Colonna M. [Breast cancer epidemiology]. Presse Med. oct 2019;48(10):1076-84
- 2-Elawonibi B, Belue R. The influence of socio-cultural factors on breast cancer screening behaviors in Lagos, Nigeria. Ethnicity & Health. 4 juill 2019;24(5):544-59

Tableau Association entre la non pratique du dépistage cancers sein et les facteurs organisationnels

Variables et modalités	N	Pratique du dépistage du cancer du sein =		RP	[95%IC RP]	Valeur de p
		Non				
		n	%			
Distance						
Moins de 1 km	18	101	56,11	1		
	0					
1-2 km	11	63	55,26	0,96	[0,60-1,54]	0,44
	4					
Plus de 2 km	81	40	49,38	0,76	[0,45-1,29]	0,15
Accueil du personnel soignant						
Satisfaisant	26	132	49,25	1		
	8					
Insatisfaisant	10	72	67,29	2,11	[1,32-3,38]	<0,001
	7					
Disponibilité du personnel soignant						
Satisfaisant	26	133	49,63	1		
	8					
Insatisfaisant	10	71	66,36	2,00	[1,25-3,19]	0,001
	7					
Avoir entendu parlé des programmes de dépistage du cancer du sein						
Oui	15	61	40,13	1		
	2					
Non	22	143	64,13	2,66	[1,74-4,07]	<0,001
	3					