

BILAN D'ACTIVITE FROTTIS CERVICO-UTERIN A L'HOPITAL ARISTIDE A L'ANNEE 2016



Ndiadé A¹, Diallo AS², Gueye MV², Diop N², SAGNA SD², Ngom AI^é, SY M².

INTRODUCTION

Le cancer du col de l'utérus est le quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde. En raison de son coût élevé, Le cancer du col de l'utérus est la principale cause de décès par cancer chez les femmes au Sénégal. Notre objectif était d'évaluer la place du frottis cervico-vaginal dans Le diagnostic des pathologies cervicales.

MÉTHODE

Il s'agissait d'une étude rétrospective étalée sur un an, allant du 01 janvier au 31 décembre 2016. Elle a été menée à partir des archives de comptes rendus de frottis cervico-vaginaux du service d'histologie embryologie et cytogénétique de l'Hôpital Aristide Le Dantec. Toutes les femmes ayant eu un frottis significatif ont été incluses. Les femmes dont les résultats ont été égarés ont été exclues.



DISCUSSION

Au total 1533 tests significatifs ont été réalisés. Nous avons noté un nombre plus important pendant les trois premiers mois, dû vraisemblablement aux effets des campagnes de sensibilisation et d'information à l'endroit de la population féminine pendant cette période. L'effet bénéfique des épisodes de sensibilisation est encore démontré et devrait inciter les professionnels de santé à les maintenir en permanence.

Avec nos résultats, nous avons constaté que le pourcentage de frottis normaux est de 34,96. Ce chiffre est supérieur à la plupart des études. Une étude faite de 1980 à 1999 à Dakar montre un pourcentage de 9,7 de frottis normaux sur une population de 100358 patientes [3]. Cette différence peut s'expliquer par un meilleur suivi des patientes dans les centres de santé depuis les années 1980. Notre résultat est moins élevé que dans les pays développés tel que la France avec un taux de 79% [11].

Les lésions intra-épithéliales de bas grade ou dysplasies légères étaient majoritaire à 63,64% (soit 28 sujets) et ceux de haut grade de 22,74% pour l'ensemble des lésions cervicales. Ces taux sont faibles par rapport à la totalité de la population étudiée mais approximatif par rapport à certaines études africaines comme celle camerounaise qui a trouvé 68 patientes ont présenté des lésions pré-invasives, soit 7,9%. Les lésions étaient dans 77,9% des lésions squameuses intra épithéliales de bas grade et dans 22,1% des lésions squameuses intra épithéliales de haut grade [14]. Notre étude révèle une fréquence de 0,34% pour l'année 2016, ce résultat, comparé à plusieurs études est très bas. En effet une étude sénégalaise en 2000 révèle un taux de 8,34% [3].

CONCLUSION :

La cytologie gynécologique grâce aux travaux entrepris par Papanicolaou depuis 1928 s'est montré comme en témoigne notre étude, primordiale dans la lutte et le traitement des lésions dysplasiques au même titre que la sensibilisation des acteurs sanitaires, des gouvernants et l'éducation des femmes au Sénégal. Cependant une meilleure organisation et une implication plus massive pourront permettre d'améliorer largement l'espérance de vie des femmes de notre pays.

- 1) SY DM, Faye O, Mbaye EHS, Diallo AS, Gueye MV, Diop N, Dem A. Dépistage primaire de cancer du col de l'utérus par frottis cervico vaginal et typage HPV dans le district de Mbao au Sénégal. Journal de Biologie Clinique. 2016;9:13.
- 2) Ndiadé A. Bilan du dépistage cytologique en 2016 par frottis cervico vaginal au laboratoire d'histologie embryologie et cytogénétique du chu Le Dantec. Ucad mémoire Numéro. 2016;283:41-4.